

Corredor do Oeste Litoral Sul

Tipo: Corredor Ecológico Estruturante da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental do OVT, Corredor estruturante primário da Rede Ecológica Metropolitana e Área Nuclear Estruturante da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental do OVT

Concelhos: Torres Vedras, Lourinhã, Peniche e Óbidos Áreas classificadas: Rede Natura 2000 (SIC Peniche/Santa Cruz e parcialmente SIC Sintra/Cascais)



Descrição geral: O corredor inicia-se junto ao aglomerado de Assenta no município de Torres Vedras, seguindo para norte ao longo de todo o litoral oeste sul, passando por Cambelas, Foz, Praia Azul, Casal das Amoreiras, Santa Cruz, Casal Ventoso, Louribetão, Praia da Vigia, Casal do Seixo e Porto Novo, no município de Torres Vedras, Porto Dinheiro, Atalaia e Praia da Areia Branca, no município da Lourinhã, São Bernardino, Consolação, Peniche, Baleal e Praia D`el Rei, no município de Peniche.

O litoral apresenta uma linha de costa com areal contínuo, mais ou menos extenso, limitado por pequenas arribas, atrás das quais se desenvolve uma extensa plataforma litoral agricultada, em pequenas parcelas e com diferentes orientações.



Este corredor coincide, quase em toda a sua extensão,

com o sítio de interesse comunitário Peniche/Santa Cruz e, com a zona do litoral mais a norte do sítio de interesse comunitário Sintra/Cascais.

O SIC Peniche/Santa Cruz desenvolve-se entre a Praia D'El Rei e Santa Cruz. Abrange uma ampla faixa costeira, que se caracteriza pela alternância entre sistemas dunares e falésias. Ambos os tipos de substrato apresentam comunidades vegetais bem estruturadas, em bom estado de conservação e com elencos florísticos relevantes, contendo diversos elementos que atingem no Sítio o limite setentrional das suas áreas de ocorrência. (PSRN2000)

O litoral rochoso possui um elevado interesse botânico expresso sobretudo na vegetação halocasmófila perene, com plumbagináceas endémicas sobre as falésias de litologia variável (calcários, margas, arenitos, etc.) submetidas à salsugem. Sobre substratos duros merecem também referência os raros tojais e urzais -tojais aero-halófilos dominados por *Ulex jussiaei* subsp. *congestus* e os prados rupícolas basófilos com plantas suculentas. (PSRN2000)

Nas zonas dunares podemos observar sistemas completos, com destaque para as dunas semifixas com matos camefíticos (dunas cinzentas) dominados pelo endemismo lusitano *Armeria welwitschii*.

Importantes são igualmente os tojais sobre areias, com ericáceas ou cistáceas, as areias com matagais de zimbro ou com matos dominados por arbustos espinhosos, e as dunas com pinhal-bravo e sob coberto não perturbado recentemente. Realce ainda para os prados salgados atlânticos existentes a Norte de Peniche, sendo esta uma das duas únicas áreas de ocorrência deste habitat na Região Biogeográfica Mediterrânica, e para os recifes que se dispõem ao longo da costa. (PSRN2000)

Esta unidade integra ainda uma pequena área do Sítio Sintra/Cascais inserida no município de Torres Vedras, correspondendo a uma faixa costeira em que as falésias rochosas e as arribas brandas vão alternando com praias arenosas, mais ou menos extensas e estreitas, até à foz do rio Sizandro.



Fonte das imagens: Site da CM da Lourinhã